# COBREPLUS®

Fungicida/battericida a base di rame ossicloruro per uso esclusivamente professionale

Gruppo FRAC: M1

**Sospensione Concentrata (SC)**

Registrazione Ministero della Salute n. 18513 del 28.03.2024

**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:

| | |
|---|---|
| rame metallico da rame ossicloruro | **g. 36.89** |
| Coformulanti | **q.b. a g. 100** |



**PERICOLO**


**MANICA COBRE S.L.**
Llacuna, 166 – 08018, Barcellona (Spagna)
info@manicacobre.com
Tel : +34 933 09 21 35
www.manicacobre.com

Distribuito da:
**Manica S.p.A.**
Via all'Adige, 4, 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 433705

Stabilimenti di produzione:
**MANICA COBRE S.L.**
Llacuna, 166 – 08018, Barcellona (Spagna)
info@manicacobre.com


**INDICAZIONI DI PERICOLO: H302+H332: Nocivo se ingerito o se inalato. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

**PREVENZIONE: P261: Evitare di respirare la nebbia. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO Di CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.**
**SMALTIMENTO: P501: Smaltire il prodotto e il recipiente in accordo alle norme locali vigenti.**
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

Contenuto netto: **0.5, 1, 1.5, 3, 5, 10, 20, 25 L - Lotto N.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi del suolo, non applicare questo o altri prodotti contenenti rame ad una dose superiore a 4 kg Cu/ha all'anno.
Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di rispetto vegetata non irrorata di 20 m dai corpi idrici superficiali (usi in campo).
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare alle piante coltivate quando sono in fiore. Non utilizzare dove le api sono attivamente alla ricerca di cibo. Non applicare in presenza di erbe infestanti in fiore.
Durante le fasi di preparazione e carico della miscela, indossare una visiera protettiva.
Non rientrare nelle aree trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta.
Ventilare a fondo le aree/le serre trattate fino all'esaurimento dello spray prima di rientrare.
Indossare indumenti protettivi durante il rientro.

**MISURE DI PRIMO SOCCORSO**
**Allontanarsi dalla zona pericolosa.**

**- In caso di contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati, sciacquare immediatamente e accuratamente la pelle sotto acqua corrente.**
**- In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare uno specialista.**
**- In caso di contatto oculare: sciacquare immediatamente per 15-20 minuti sotto un getto d'acqua con le palpebre aperte. Consultare uno specialista.**
**- In caso di inalazione: in caso di disturbi respiratori, contattare immediatamente i servizi di emergenza o un centro antiveleni.**
**- In caso di ingestione: sciacquare immediatamente la bocca con acqua. Non indurre il vomito senza consultare un medico.**
**- Se i sintomi persistono consultare un medico e tenere a disposizione la confezione o l'etichetta e mostrargli l'etichetta e/o la scheda di sicurezza.**
**- In caso di intossicazione animale: contattare un veterinario.**

**USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

COBREPLUS® è un fungicida-battericida per uso professionale da contatto a base di rame (sotto forma di ossicloruro di rame) che inibisce la crescita di malattie causate da patogeni fungini e batterici.
Può essere impiegato su colture di olivo (in campo) e pomodoro (in campo ed in serra).

**Olivo (in campo)**: usare esclusivamente contro *Cycloconium oleaginum* e *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi*. Dosi di impiego: 150 ml/hl /1.50 Lp.f./ha); volume d'acqua: 1000 L/ha. Applicare il prodotto per un massimo di 3 trattamenti a stagione. Procedere con le prime due applicazioni in primavera, dal momento delle comparsa visibile della prima foglia (BBCH 11) alla fine del periodo di fioritura (BBCH 69), con un mese di intervallo tra le applicazioni. Terminare con una terza applicazione tra l'inizio della colorazione del frutto (BBCH 80) e la sua maturazione avanzata (BBCH 85). Applicare manualmente con lancia o pistola, o con con zaino oppure con trattore.

**Pomodoro (in campo e in serra):** contro *Phytophthora infestans*.e Batteriosi.

Dosi di impiego: 100-120 ml/hl /1.0 Lp.f./ha); volume d'acqua: 750-1000 L/ha. Applicare il prodotto per un massimo di 4 trattamenti a stagione con un 4-17 giorni di intervallo dal momento della comparsa delle prime foglie (BBCH 15) al momento delle completa maturazione dei frutti (BBCH 89). In campo, applicare manualmente con lancia o pistola, o con con zaino oppure con trattore. In serra, irrorare con cannone atomizzatore dall'esterno.

**EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

| Coltura | Avversità | Dose massima per applicazione | Numero massimo di applicazioni (intervallo minimo) | Periodo di applicazione/fase di crescita della coltura |
|---|---|---|---|---|
| **Olivo** | *Cycloconium oleaginum*<br><br>*Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi* | 1.50 Lp.f./ha [150 ml/hl] | 3 (1 mese) | BBCH 11-69 e BBCH 80-85 |
| **Pomodoro** | *Phytophthora infestans*<br><br>*Batteriosi* | 1.0 Lp.f./ha | 4 (7-14 giorni) | BBCH 15-89 |

**PREPARAZIONE**

Riempire il serbatoio dell'irroratrice per due terzi, accendere il sistema di agitazione, quindi versare direttamente COBREPLUS®.

Riempire il serbatoio con il volume d'acqua necessario mantenendo l'agitazione.

Agitare energicamente la miscela prima dell'uso.

**COMPATIBILITÀ:** il prodotto si impiega da solo.

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici e rispettati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta**.**

**STOCCAGGIO DEL PRODOTTO**

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale, in un locale adibito allo stoccaggio di prodotti fitosanitari conforme alle norme in vigore, lontano da bevande e alimenti, compresi quelli per animali. Tenere fuori dalla portata di bambini e delle persone non autorizzate. Tenere al riparo dal gelo e da fonti di calore. Conservare in luogo ben ventilato.

È proibito riutilizzare l'imballaggio.

Dopo l'utilizzo del prodotto, svuotare completamente il contenitore e sciacquarlo con acqua pulita (risciacquo manuale: agitare 3 volte la bottiglia riempita per 1/3 o risciacquo meccanico per almeno 30 secondi) assicurandosi di versare l'acqua di risciacquo nella vasca dell'irroratrice.

Per lo smaltimento del prodotto inutilizzabile, conservare il prodotto nella sua confezione originale. Rivolgersi a una società autorizzata per la raccolta e lo smaltiment di prodotti pericolosi.

**In caso di sversamento accidentale**

Proteggersi (con adeguati DPI) e assicurare l'area.
Avvisare i vigili del fuoco in caso di pericolo immediato per l'ambiente che non è possibile gestire autonomamente. Raccogliere tutto ciò che potrebbe essere entrato in contatto con il prodotto, terreno contaminato incluso. Pulire il sito e le attrezzature utilizzate, avendo cura di contenere gli effluenti generati dall'operazione di pulizia. Smaltirli secondo le normative vigenti.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per l'uso su olivo e 3 giorni prima della raccolta per uso su pomodoro.

**ATTENZIONE**

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**