ECORAM®

Fungicida a base di solfato tribasico di rame
Granuli idrodispersibili (WG)
Meccanismo d'azione FRAC M01

ECORAM® - Registrazione Ministero della Salute n.17965 del 07/08/2026

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

RAME METALLO	g	6
(sotto forma di Solfato tribasico)		
Coformulanti	q .b. a	g. 100

Contenuto:
1-2-5-10-20-25 Kg

Partita n° ……..

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell'ambiente. **P280** Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi**.**
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Nell'impiego in serra, utilizzare indumenti da lavoro**.** Nell'impiego in campo e serra aperta, durante le attività di miscelazione e carico, gli operatori devono utilizzare indumenti da lavoro adeguati. I lavoratori che rientrano in campo o nella serra aperta dopo il trattamento devono indossare pantaloni lunghi e camicia a maniche lunghe. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Negli impieghi in campo o in serre aperte, per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori durante il periodo di fioritura, è consentita una dose massima di applicazione di 2,5 kg di rame per ettaro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ECORAM® è una formulazione rameica caratterizzata da massima adesività ed ottimale rapporto prontezza d'azione/persistenza. La forma di rame contenuta e la speciale formulazione permettono l'impiego di ECORAM® anche durante il periodo vegetativo su pomacee e drupacee. Il prodotto è stato studiato appositamente per minimizzare l'apporto di rame su colture come vite e pomodoro e restare al di sotto dei limiti previsti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Epoche d'impiego	Dosi d'impiego	Dose/ha	Volumi d'acqua (L/ha)	N° max trattamenti anno	Intervallo tra i trattamenti (gg)
POMACEE (melo, pero, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone, nashi)	Ticchiolatura (*Venturia spp.*) e Batteriosi	Trattamenti da fine fioritura	100-600 g/hL	1,5-3,0 Kg	500-1500	6	7
DRUPACEE (,ciliegio, susino, pesco e nettarino)	Batteriosi (*Xanthomonas spp.*)	Trattamenti da fine fioritura	150-300 g/hL	1,5-3,0 Kg	1000	6	7
VITE	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	Al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia fino in prossimità della raccolta.	300-1000 g/hL	3,0-5,0 Kg	500-1000	10	7
MANDORLO	Batteriosi (*Xanthomonas spp.*)	Trattamenti da fine fioritura	150-300 g/hL	1,5-3,0 Kg	1000	3	14
POMODORO, MELANZANA (in campo e in serra)	Peronospora (*Phytophthora spp.*)	Al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia fino in prossimità della raccolta.	375-1000 g/hL	3,0-5,0 Kg	500-800	10	7

Su tutte le colture, in caso di utilizzo di volumi d'acqua diversi da quelli sopra indicati, adeguare la dose per ettolitro in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).

INTERVALLO DI SICUREZZA: SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO E MELANZANA, 7 GIORNI SU VITE E POMACEE, 14 GIORNI SU MANDORLO E 21 GIORNI SU DRUPACEE

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® ECORAM è un marchio registrato de MANICA SpA

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 07/08/2026