

**MANAMID® 100 SC**

**Fungicida per la lotta contro la Peronospora della patata, pomodoro e vite**  
Sospensione concentrata: **FRAC: 21**

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g di prodotto)  
Cyazofamid puro g 9,5 (= 100 g/L)  
Coformulanti q.b. a g 100

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO:**

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

MANICA S.p.A. Via all'Adige ,4 – 38068 Rovereto (TN)- tel. 0464-433705

**OFFICINA DI PRODUZIONE**

MANICA S.p.A. – Via All'Adige 4 – 38068 Rovereto (TN)

IRCA SERVICE S.p.A., Strada Statale Cremasca n.10 – 24040 Forno San Giovanni (BG)

DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG)

STI SOLFOTECNICA Italiana Spa – Cotignola (RA)

**Registrazione Ministero della Salute n. 16950 del 16/01/2020**

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 5, 10  
Partita N.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**Vite:** Utilizzare tuta protettiva per applicazione in campo.

**Pomodori in campo:** Utilizzare tuta e guanti durante le operazioni di miscelamento e caricamento con macchine irroratrici. Utilizzare tuta per applicazione manuale e con macchine irroratrici.

**Pomodori in serra:** Utilizzare guanti e tuta durante l'applicazione manuale.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per vite solo su applicazioni tardive, in combinazione con una riduzione della deriva del 50%.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

**CARATTERISTICHE**

MANAMID® 100 SC è un fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora di vite, pomodoro e patata; è dotato di elevata affinità per le cere cuticolari, con moderata capacità di penetrazione; ne derivano resistenza all'azione dilavante della pioggia e parziale redistribuzione all'interno della vegetazione trattata. Adattare la cadenza dei trattamenti in base all'andamento meteorologico e alla pressione della malattia

**MODALITÀ D'IMPIEGO**

Diluire direttamente in acqua la dose prescritta. In caso di impiego di irroratrici a basso volume, le dosi prescritte vanno mantenute in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

**CAMPI DI IMPIEGO E DOSI**

Coltura	Avversità	Epoche d'impiego	Dosi/ha	Volume D'acqua (L)	N° max trattamenti anno	Intervallo tra i trattamenti (gg)
VITE	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> ),	BBCH 11-89 (da prefioritura a maturazione)	0,9-1,1 L/ha	300-1000	4	(8-10 a dose minima, 12-14 a dose max)
POMODORO (da industria e mensa) in pieno campo e serra	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	BBCH 12-89 (da prefioritura a maturazione)	0,8 L/ha	400-1000	6	7-10
PATATA	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	BBCH 12-89 (da sviluppo fogliare a pre-raccolta)	0,8 L/ha	200-500	6	5-7 (fino a 10 in caso di basso rischio)

**Gestione del rischio di resistenza**

MANAMID® 100 SC contiene la sostanza attiva cyazofamide che appartiene al gruppo 21 del FRAC. Per gestire il rischio di comparsa di resistenza in campo, adottare i seguenti accorgimenti: applicare il prodotto prima dell'evento infettante; miscelare con antiperonosporici aventi diverso meccanismo d'azione; impiegare il prodotto in un programma che preveda l'uso di antiperonosporici aventi diverso meccanismo d'azione.

**Compatibilità.** Il formulato si è mostrato compatibile con numerosi prodotti commerciali tra cui quelli a base delle seguenti sostanze attive:

- Fungicidi: azoxistrobin, benalaxyl m, cimoxanil, dimetomorf, folpet, fosetil alluminio, fosfonato di sodio, fosfonato di potassio, mancozeb, metalaxyl-m, metiram, penconazolo, rame metallo, zolfo.
- Insetticidi: abamectina, deltametrina, imidacloprid, lambda-cialotrina.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per patata, 3 giorni su pomodoro in serra ed in pieno campo, 21 su vite.**

**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO.**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

# MANAMID<sup>®</sup> 100 SC

Fungicida per la lotta contro la Peronospora della patata, pomodoro e vite

Sospensione concentrata: **FRAC: 21**

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g di prodotto)	
Cyazofamid puro	g 9,5 (= 100 g/L)
Coformulanti	q.b. a g 100



**ATTENZIONE**

## INDICAZIONI DI PERICOLO:

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

## TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

MANICA S.p.A. Via all'Adige ,4 – 38068 Rovereto (TN)- tel. 0464-433705

## OFFICINA DI PRODUZIONE

MANICA S.p.A. – Via All'Adige 4 – 38068 Rovereto (TN)

IRCA SERVICE S.p.A., Strada Statale Cremasca n.10 – 24040 Forno San Giovanni (BG)

DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG)

STI SOLFOTECNICA Italiana Spa – Cotignola (RA)

**Registrazione Ministero della Salute n. 16950 del 16/01/2020**

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100

Partita N.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**