



Idrox 20

FUNGICIDA A BASE DI RAME SOTTOFORMA DI IDROSSIDO. MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora. Azione collaterale contro: Escoriosi, Marciume nero degli acini o Black-rot, Melanosi, Rossore parassitario. Dosi di impiego: 200-300 g/hl (2-3 kg/ha). Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione preventiva. **POMACEE:** contro Ticchiolatura, Cancro rameale, Muffa a circoli, Marciume del colletto, Septoriosi, Colpo di fuoco batterico. Dosi di impiego: - trattamenti autunno-invernali e cancri: 200-210 g/hl (3,0-3,2 kg/ha); - trattamenti alla ripresa vegetativa (ingrossamento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 170-180 g/hl (2,0-2,7 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. Marciume del colletto: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 230 g/hl. Colpo di fuoco batterico del pero: dosi di impiego 60-70 g/hl nei trattamenti autunnali su cv. non cuprosensibili. **NESPOLO:** contro Brusone o Ticchiolatura. Maculatura fogliare. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 220-280 g/hl (2,2-3,3 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. **DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO):** Solo trattamenti autunno-invernali contro Bolla del pesco, Corineo, Moniliosi, Cancro rameale, Seccume dei rami, Cladosporiosi, Ruggine. Cilindrosporiosi del ciliegio, Scopazzi del ciliegio, Bozzacchioni del susino. Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee. Dosi di impiego: 270-290 g/hl (2,7-3,5 kg/ha). Marciume del colletto: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 230 g/hl. **AGRUMI:** contro Mal secco, Marciume o Gommosi del colletto, Allupatura Cancro gommoso, Fumaggine, Antracnosi, Attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi. Trattamenti a partire da fine inverno. Dosi di impiego: 230-350 g/hl (2,3-3,5 kg/ha). **OLIVO:** contro Occhio di pavone, Cercosporiosi, Lebbra, Rogna, Fumaggine. Attività collaterale contro il Marciume delle drupe. Intervenire alla fine di settembre - inizio ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura. Dosi di impiego: 230-330 g/hl (2,3-3,25 kg/ha). **ACTINIDIA:** contro Marciume del colletto, Alternaria, Maculatura batterica. Interventi al bruno. Dose d'impiego: 230-350 g/hl (2,3-3,5 kg/ha). Per il Marciume del colletto distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 230 g/hl. **FRAGOLA:** contro Marciume bruno del colletto, Vaiolatura, Maculatura zonata, Maculatura rosso-bruna, Maculatura angolare. Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa

vegetativa. Dosi di impiego: 190-240 g/hl (1,9-2,4 kg/ha). **FRUTTIFERI A GUSCIO (NOCE, NOCCIOLO, CASTAGNO, MANDORLO):** contro Antracnosi del noce, Mal dello stacco del nocciolo, Seccume fogliare del nocciolo, Fersa del castagno. Attività collaterale contro Macchie nere del noce, Necrosi batterica del nocciolo, Cancro batterico del nocciolo. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 260-280 g/hl (2,6-2,8 kg/ha). **ORTAGGI A FRUTTO: 1. POMODORO:** contro Peronospora, Marciume zonato, Septoria, Cladosporiosi, Alternariosi, Nerume, Necrosi del midollo, Picchiettatura batterica, Maculatura batterica. Attività collaterale contro Cancro batterico, Muffa grigia. Dosi di impiego: 250-300 g/hl (2,5-3,0 kg/ha). **MELANZANA:** contro Marciume pedale del fusto, Vaiolatura dei frutti o Antracnosi. Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Dosi di impiego: 190-250 g/hl (1,9-2,5 kg/ha). **2. CUCURBITACEE CON BUCCIA COMMESTIBILE (CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO):** contro Peronospora delle cucurbitacee, Antracnosi, Maculatura angolare. Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Dosi di impiego: 150-200 g/hl (1,5-2,5 kg/ha). **ORTAGGI A STELO: CARCIOFO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, ASPARAGO** (effettuare i trattamenti esclusivamente dopo la raccolta del turione): contro Peronospora del carciofo e del cardo, Ruggine dell'asparago, Septoriosi del sedano, Cercosporiosi, Ramularia, Cladosporiosi. Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Dosi di impiego: 190-250 g/hl (1,15-2,5 kg/ha). **ORTAGGI A FOGLIA (LATTUGA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA/RADICCHIO, RUCOLA, SPINACIO):** contro Peronospora, Cercosporiosi, Alternariosi, Antracnosi, Marciume batterico, Maculatura batterica. Non impiegare su baby leaf. **ERBE FRESCHE (PREZZEMOLO):** contro la Septoriosi del prezzemolo. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 190-250 g/hl (1,15-2,5 kg/ha). **CAVOLI:** a infiorescenza, a testa, a foglia. Contro: Peronospora delle crocifere, Micosferella del cavolo, Ruggine bianca delle crocifere. Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo. Dosi di impiego: 190-250 g/hl (1,15-2,5 kg/ha). **LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA (FAGIOLINO, FAGIOLO, PISELLO, FAVA):** contro Antracnosi, Peronospora, Ruggine. Attività collaterale contro Batteriosi. Dosi di impiego: 190-250 g/hl (1,15-2,5 kg/ha).

FLOREALI (ROSA, GAROFANO, GERANIO, CICLAMINO, CRISANTEMO, ECC.), ORNAMENTALI (OLEANDRO, LAUROCERASO, ECC.), FORESTALI: contro Peronospora della rosa, Ruggine della rosa, Ticchiolatura della rosa, Ruggine del garofano, Ruggine bianca del crisantemo, Disseccamento del lauroceraso, Maculatura fogliare della palma. Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 190-230 g/hl (1,15-2,3 kg/ha). **CIPRESSO:** contro il Cancro del cipresso. Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in primavera e autunno. Dosi di impiego: 400-500 g/hl (3,2-5,0 kg/ha). **TABACCO:** contro la Peronospora del tabacco. Dosi di impiego: 200 - 250 g/hl (1,6-2,5 kg/ha). **OLEAGINOSE:** contro Peronospora della soia, Alternariosi della soia, Peronospora del girasole. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 2,5-3,0 kg/ha.



COMPOSIZIONE

RAME metallo g. 20
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b. a g. 100

FORMULAZIONE

Microgranuli idrodispersibili

CONFEZIONE



COLORAZIONE

Non colorato

CLASSIFICAZIONE

CLP: Pericolo - H318 - H410



MISCIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

TEMPO DI CARENZA

7 gg. ortaggi a foglia
3 gg. fragola, pomodoro, altri ortaggi
20 gg. carciofo, cardo, sedano, finocchio, altre colture

REGISTRAZIONE

N. 16205 del 16.02.2015