



# MANYTOP

BIOSTIMOLANTE IDROLIZZATO PROTEICO DI ERBA MEDICA,  
MELASSO E ALGHE.



## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Dosi fogliari (kg/ha)	N. trattamenti	Momento applicazione
VITE	2-3	3	Ripresa vegetativa - Allegazione - Pre-chiusura dei grappoli.
AGRUMI	2-3	3	Ripresa vegetativa - Pre-fioritura - Fine allegazione.
OLIVO	2-3	3	Pre-fioritura - Allegazione - Indurimento dei noccioli.
POMACEE, DRUPACEE, ACTINIDIA	2-3	3	Pre-fioritura - Allegazione - Accrescimento dei frutti.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA	1-2	3	Al 1° palco fiorale. Altri 2 interventi a distanza di 15 giorni.
FRAGOLA, MELONE, ANGURIA, ZUCCHINO	1-2	3	Pre-fioritura - Altri 2 interventi a distanza di 15 giorni.
PATATA	1-2	3	Da inizio sviluppo dei tuberi ogni 15 giorni.
CARCIOFO	1-2	3	Dalla formazione dei capolini ogni 15 giorni.
FAGIOLO, FAGIOLINO, PISELLO	1-2	3	Ogni 15 giorni dalla fase dei bottoni fiorali.
ORTAGGI A FOGLIA	1-2	3	A distanza di 20 giorni.
ERBA MEDICA	1-2	2	Pre-fioritura - Allegazione per le coltivazioni destinate alla produzione di seme.
FLOREALI E ORNAMENTALI	1-2	2	A distanza di 15-20 giorni dalla ripresa vegetativa e/o sviluppo vegetativo.



## NOTA TECNICA

### COMPOSIZIONE

AZOTO (N) organico	1,5%
CARBONIO (C) organico di origine biologica	15%
OSSIDO DI POTASSIO (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	7%
BETAINE	1%

### FORMULAZIONE

Liquido

### CONFEZIONE



### COLORAZIONE

Non colorato

### CLASSIFICAZIONE

### MISCIBILITÀ

Non miscelare con prodotti a base di zolfo o rame.

### REGISTRAZIONE

Concime nazionale