



ZOLFO LIQUIDO 80 SC

FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO.
SOSPENSIONE CONCENTRATA.



NOVITÀ

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Patologia	Stadio di applicazione	Dosi (l/ha)	N. max. di applicazioni (intervallo gg.)	Intervallo prima della raccolta (gg.)
BARBABIETOLA	Oidio	BBCH 10-89	7,5	2 (15)	3
GRANO	Oidio	BBCH 10-89	10	2 (14)	35
MELONE	Oidio	BBCH 10-89	7,5	5 (7)	3
ORZO	Oidio	BBCH 10-89	10	2 (14)	35
MELO	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 60	7,5	9 (7)	3
ZUCCHINA	Oidio	BBCH 10-89	7,5	3 (7)	3
ROSETO	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 60	3	5 (10)	-
VITE	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 15	4	8 (7)	5
POMODORO	Oidio	BBCH 10-89	2	6 (10)	3
PESCO	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 69	5	3 (7)	3
CETRIOLO, CETRIOLINO E ALTRE CUCURBITACEE A BUCCIA COMMESTIBILE	Oidio	BBCH 10-89	7,5	6 (7)	3
PEPERONE	Oidio	BBCH 10-89	5	6 (10)	3
PISELLI SENZA BACELLO FRESCI	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 60	7,5	1	3
ZUCCA, ANGIURIA E ALTRE CUCURBITACEE A BUCCIA COMMESTIBILE	Oidio	BBCH 10-89	5	8 (7)	3
LATTUGA	Oidio	BBCH 10-89	7,5	4 (15)	3
FRAGOLA	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 60	7,5	8 (9)	3

COMPOSIZIONE

ZOLFO
Coformulanti q.b. a

800 g/l
g. 100

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

CONFEZIONE



COLORAZIONE

Non colorato

CLASSIFICAZIONE

MISCIBILITÀ

Non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con oli minerali, con Captano e prodotti contenenti solventi organici di origine vegetale.

TEMPO DI CARENZA

Vedi tabella

REGISTRAZIONE

N. 17264 del 30.07.2018